

Plan de prises des médicaments

Matin	Midi	Soir	Coucher
1 Eupressyl 60 mg		1 Ezetrol 10 mg	1 Havlane 1 mg
1 Cotareg 160 mg/25 mg		1 Lercanidipine 20 mg	
1 Aspirine Protect 100 mg		1 Eupressyl 60 mg	



24 mars 2018

Plan de prises des médicaments

Matin

**1 Comprimé Aspirine protect 100 mg avant le repas
1 Gélule Eupressyl 60 mg
1 Comprimé Cotareg 160 mg/25 mg**

Midi

Soir

**1 Comprimé Ezetrol 10 mg
1 Comprimé lercanidipine 20 mg
1 Eupressyl 60 mg**

Coucher

1 Comprimé havlane 1 mg



24 mars 2018

Aspirine protect

Molécule (DCI): Acide acétylsalicylique

Indication: Prévention des complications secondaires vasculaires chez les patients présentant une maladie athéromateuse ischémique

Posologie patient: 100 mg
(posologie usuelle 100 à 300 mg/j)

Modalités d'administration:
à avaler avec un verre d'eau préférentiellement avant le repas.

Effets secondaires:

- ☞ Troubles digestif
- ☞ Hémorragie



Cotareg 160/25

Molécule (DCI): Valsartan 160 mg associé hydrochlorothiazide 25 mg

Indication: Hypertension artérielle

Posologie patient: 1 comprimé par jour
(posologie usuelle 1 comprimé par jour)

Modalités d'administration:

à avaler avec un verre d'eau en dehors ou pendant un repas.

Effets secondaires:

- ☞ Vertiges
- ☞ Céphalées



24 mars 2018

Eupressyl 60 mg

Molécule (DCI): Urapidil 60 mg

Indication: Hypertension artérielle

Posologie patient: 60 mg matin 60 mg soir
(posologie usuelle 60 à 180 mg/j en 2 prises matin et soir)

Modalités d'administration:

Les gélules peuvent être prises avant, pendant ou après les repas.

Effets secondaires:

- ☞ Vertiges
- ☞ Céphalée
- ☞ palpitations



24 mars 2018

Ezetrol 10 mg

Molécule (DCI): Ezetimibe 10 mg

Indication: Hypercholestérolémie essentielle

Posologie patient: 10 mg le soir
(posologie usuelle 10 mg/j)

Modalités d'administration:

Le comprimé peut être pris avant, pendant ou après les repas.

Effets secondaires:

- ☞ Céphalée
- ☞ Douleurs abdominales
- ☞ Myalgies



24 mars 2018

Havlane 1 mg

Molécule (DCI): loprazolam 1 mg

Indication: Insomnie

Posologie patient: 1 mg au coucher
(posologie usuelle 1 mg/j)

Modalités d'administration:

A prendre avant le coucher

Effets secondaires:

- ☞ Somnolence
- ☞ Céphalées
- ☞ Sensations ébrieuses



24 mars 2018

Lercanidipine 20 mg

Molécule (DCI): lercanidipine 20 mg

Indication: Hypertension artérielle

Posologie patient: 20 mg le matin
(posologie usuelle 10 à 20 mg/j)

Modalités d'administration:

Les comprimés peuvent être prises avant, pendant ou après les repas.

Effets secondaires:

- ☞ œdème es jambes
- ☞ Rougeur de la face
- ☞ Etourdissement



24 mars 2018